



Viamed

Tel.: 55 (11) 5908-5680

HEMODINÂMICA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA



Preparo para Angioplastia de Carótida

• **Chegar uma (1) hora antes do horário marcado;**

• Jejum absoluto de 08 (oito) horas (sem comer, sem fumar e sem beber água); Se precisar tomar medicamentos nesse intervalo, tomar com o mínimo de água possível.

OBS.: Tomar mesmo em jejum as medicações para Pressão alta e Coração.

• Exames

Trazer exames pré-operatórios e exames anteriores (Todos)

ECG (eletrocardiograma) – Hemograma completo – Uréia – Creatinina – Sódio e Potássio – Glicemia (em jejum) – Descrição cirúrgica, caso tenha realizado.

Na ausência destes comunicar a Central de Relacionamento.

• Se **diabético** suspender 02 dias antes, o medicamento metformina. Caso utilize insulina entrar em contato com nosso médico.

• Suspender medicamento **anticoagulante** 05 (cinco) dias antes do exame (Marcoumar, Marevan e Dindevan) com orientação do seu médico. Solicitar ao médico que após 5º dia de suspensão, necessário coleta de um coagulograma completo.

• 03 (três) dias antes do exame tomar : 01 (um) comprimido de Plavix 75 mg por dia ou Ticlid 250 mg- 12/12 horas; 02 comprimidos de AAS infantil por dia.

• Trazer 01 (um) acompanhante maior de 18 anos;

• Trazer RG e CPF do paciente e do acompanhante;

• Trazer pedido e autorização (guia) originais;

• Obs.: Todos os itens acima relacionados são obrigatórios, na falta de algum item, o procedimento poderá ser cancelado.

• **Após o procedimento o paciente ficará internado na UTI ou Quarto, conforme orientação médica.**

• **Paciente de outra Instituição (transferência) solicitar cópia : prescrição médica, evolução, controles (PA/Tº/FC/ SAT) Resultado de exames realizados no hospital. Telefone do médico solicitante para retorno após término do procedimento.**